

# Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014-2017.

Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2017\* (\*dane za 2017 rok do 15 września)

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ogółem	16	4	9	7	3	92

Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego w 2017 roku

PSSE	1.01 – 15.09.2017	PSSE	1.01-15.09.2017
Bielsko – Biała	7	Lubliniec	0
Bytom	9	Myszków	2
Chorzów	3	Racibórz	0
Cieszyn	0	Ruda Śląska	11
Częstochowa	3	Rybnik	1
Dąbrowa Górnicza	12	Sosnowiec	19
Gliwice	7	Tychy	4
Jaworzno	0	Wodzisław Śląski	0
Katowice	11	Zawiercie	0
Kłobuck	2	Żywiec	1
<b>Ogółem 92</b>			

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 15 września 2017 r. odnotowano **1426** przypadków WZW A.

**Wirusowe zapalenie wątroby typu A** (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

#### Do zakażenia może dojść poprzez:

– spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),

---

- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W dziewięciu ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 24 zachorowań.

**Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny**, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. **Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka**, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

# ŻÓŁTACZKA POKARMOWA

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

**ZAWSZE  
MYJ RĘCE**



WIRUSEM MOŻESZ  
ZAKAZIĆ SIĘ PRZEZ  
BRUD NA RĘKACH,  
KTÓRYMI SPOŻYWASZ  
POSIŁKI

**PIJ WODĘ  
PRZEGOTOWANĄ**



WIRUSEM  
MOŻESZ  
ZAKAZIĆ SIĘ  
PRZEZ SPOŻYCIE  
SKAŻONEJ  
WODY/LODU

**MYJ  
ŻYWNOSĆ**



WIRUSEM MOŻESZ  
ZAKAZIĆ SIĘ PRZEZ  
SPOŻYCIE  
PRODUKTÓW  
UMYTYCH W  
SKAŻONEJ WODZIE

**ZASZCZEP  
SIĘ**



**SKUTECZNYM  
SPOSOBEM NA  
"WZW TYPU A"  
JEST SZCZEPLENIE  
OCHRONNE**

### MYCIE RĄK TARCZĄ OCHRONNĄ PRZED ŻÓŁTACZKĄ POKARMOWĄ

